

8 ACTIONS POUR PROTÉGER MON BÉBÉ DE LA BRONCHIOLITE

- 1 Lavez-vous les mains régulièrement
- 2 Aérez la chambre et les pièces de vie
- 3 Evitez toute exposition au tabac
- 4 Evitez les endroits confinés et très fréquentés (supermarchés, transports en commun..)
- 5 Evitez les contacts avec les personnes enrhumées
- 6 Portez un masque si vous êtes malade
- 7 Evitez le partage de tétines, biberons et jouets avec d'autres enfants, et lavez les régulièrement
- 8 Une nouvelle modalité de prévention contre le virus "VRS"




Parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme
Pour les nourrissons nés à partir de février 2025, votre
médecin peut prescrire l'injection d'une immunoglobuline
(Nirsevimab), ou vous pouvez vous faire vacciner avec
Abrysvo pour protéger votre bébé.



**INFORMATION A
 DESTINATION DES
 FAMILLES**

PREVENTION DE LA BRONCHIOLITE À VRS



Pour la saison épidémique 2025/2026, il est recommandé une injection de Nirsevimab

POUR QUI EST-IL RECOMMANDÉ CETTE ANNÉE ?

- Pour les femmes enceintes entre la 32e et la 36e semaine d'aménorrhée à partir du 1er septembre
- Pour tous les nourrissons nés à partir de février 2025
- Pour tous les nouveau-nés prématurés ou avec d'autres facteurs de risque, selon les critères qui vous seront expliqués par votre médecin

QUAND EST-IL RECOMMANDÉ DE L'ADMINISTRER ?

Entre septembre 2024 et janvier 2025.

QUI PEUT LE PRESCRIRE ?

- Le médecin en maternité,
- Le pédiatre
- Le médecin généraliste de ville

La durée d'efficacité est de 5 mois.

COMMENT EST-IL ADMINISTRÉ ?

Par voie intra musculaire dans la cuisse. Il peut être administré en même temps qu'un autre vaccin.

OÙ LE TROUVER ?

- En établissement de santé à partir de septembre
- En officine de ville sur prescription du médecin ou de la sage-femme

QUEL COÛT ?

En France, il sera délivrée pour la saison 2025/2026. Il est pris en charge à 30% par les pouvoirs publics

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ?

- Réactions les plus fréquentes : douleurs au point d'injection, douleurs musculaires et maux de tête durant moins de 2 jours
- Comme pour tout médicament il existe un risque théorique d'allergie.

Bronchiolite à VRS

Vous avez été informé de la possibilité de vaccination par Abrysvo pendant le 8e mois de grossesse ou d'administration du Nirsevimab (Beyfortus®) à votre enfant



La **BRONCHIOLITE** est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de deux ans.

Elle est due le plus souvent à un virus appelé Virus Respiratoire Syncytial (VRS) qui touche les petites bronches. La bronchiolite est une maladie très contagieuse. Le virus circule de manière épidémique entre octobre et mars tous les ans.

Le virus se transmet facilement

- D'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements.
- Le virus peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous")

Les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du VRS n'ont habituellement aucun signe ou ont un simple rhume. Ainsi, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir.

Conséquences chez l'enfant

Le VRS est le responsable principal des bronchiolites (50 à 70%) associant :

- Gêne respiratoire, fièvre, difficulté à manger ;
- Parfois otites et pneumopathies ;
- Et induit de nombreuses hospitalisations, ou soins ;

Tous ne feront pas des formes graves mais l'âge de moins de 3 mois est un des principaux facteurs de risque.

L'administration d'un traitement préventif par Abrysvo ou Beyfortus® ne dispense pas de respecter les MESURES BARRIERES qui restent importantes pour prévenir l'ensemble des infections respiratoires.